

ESPECIES	CRITERIOS
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	A1(NT)
<i>Rallus antarcticus</i>	A1(VU), A4i
<i>Pluvianellus socialis</i>	A1(NT)
Endemismos de Argentina (1 especie)	C2

común (*Gallinago paraguayae*), chorlito doble collar (*Charadrius falklandicus*) y playerito unicolor (*Calidris bairdii*). La subespecie de macá grande (*Podiceps major navasi*) está presente con regularidad en las costas del lago. Existen varios registros del pato cabeza negra

(*Heteronetta atricapilla*) siendo los más australes conocidos para la especie.

■ Conservación

La reserva municipal fue creada en 1995 pero su implementación recién comenzó cuando el manejo se puso a cargo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en el 2001. La jurisdicción es municipal.

■ Referencias

Ferrari *et al.* (2003), Imberti (2003), Imberti y Albrieu (2001), Imberti y Albrieu (2004)

SC13 Meseta del Asador (o Aguila)¹⁴ | Por Santiago Imberti

Departamento Río Chico, Santa Cruz
 Coordenadas: 47°44'S 71°12'W
 Superficie: 30.000 ha

Características generales
 Criterios: A1(4), A2(2), A3(7), A4i(1), C2(1)
 Ecorregión: Estepa Patagónica
 Propiedad: Privada
 Protección: No tiene
 Hábitat: Pastizal, humedal, estepa arbustiva
 Usos de la tierra: Ganadería
 Amenazas: Sobrepastoreo, introducción de especies exóticas



■ Descripción

Ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz, al este del PN Perito Moreno (AICA SC09), consiste en tres mesetas basálticas aisladas una de otra, abarcando desde los alrededores del lago Asador hacia el

noroeste del lago Olnie. Las mesetas superan los 1.100 m s.n.m. y están salpicadas con lagunas, generalmente rodeadas de paredones basálticos y presentando variables extensiones de vegetación flotante, especialmente gambarrusa (*Myriophyllum elatinoides*).



Águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*). Foto: Hernán R. Goñi

¹⁴ Imberti, S. 2005. Meseta del Asador (o Aguila). En A. S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 423-424. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

La tierra ha sido principalmente destinada a la ganadería y en los últimos años, algunos establecimientos de la zona han comenzado a recibir algunos turistas. La población más cercana es Hipólito Yrigoyen (Lago Posadas) a sólo 80 km, pero sin buenas rutas de acceso. La ocupación humana data de 2100 A.P. y muestra un uso continuo como área de caza y aprovisionamiento de material lítico. Las lagartijas amarilla y negra (*Liolaemus gallardoi*) y la espinosa estriada (*Liolaemus hatcheri*) son endémicas de la meseta del Asador, Águila y el P.N. Perito Moreno.

La introducción de salmónidos para producción comercial podría afectar a las poblaciones de aves acuáticas como en otras regiones de la provincia aunque al parecer es de carácter localizado.

■ Importancia ornitológica

Se ha registrado nidificación de macá tobiano (*Podiceps gallardoi*) en varias lagunas. Aves amenazadas como el choique (*Rhea pennata*) y el chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) son nidificantes. El flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) es visitante regular. La quila patagónica (*Tinamotis ingoufi*) es nidificante y probablemente más abundante de lo estimado. Especies de dis-

ESPECIES	CRITERIOS
<i>Rhea pennata</i>	A1(NT)
<i>Podiceps gallardoi</i>	A1(NT), A4i
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	A1(NT)
<i>Pluvianellus socialis</i>	A1(NT)
<i>Geositta antarctica</i>	A2(EBA 062)
<i>Neoxolmis rufiventris</i>	A2(EBA 062)
Endemismos de bioma (7 especies)	A3(PAT)
Endemismos de Argentina (1 especie)	C2

tribución restringida como la caminera patagónica (*Geositta antarctica*) y la monjita chocolate (*Neoxolmis rufiventris*) cuentan con importantes poblaciones y son nidificantes.

■ Conservación

No existen figuras de conservación.

■ Referencias

Chebez (1994), Chebez *et al.* (2004), Fjeldså y Krabbe (1990), Goñi (2000-02), Johnson (1997), Johnson y Serret (1994)

SC14 Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias* ¹⁵ | Por Santiago Imberti

* Estancias El Sotiego, La Soledad y Anita
Departamento Lago Argentino, Santa Cruz
Coordenadas: 49°55' S 73°05' W
Superficie: 778.800 ha

Características generales

Criterios: A1(5), A2(5), A3(24), A4i(1), C2(2)

Ecorregión: Bosques Patagónicos

Propiedad: Estatal (nacional) y privada

Protección: Parcial

Hábitat: Humedal, bosque, pastizal, estepa arbustiva

Usos de la tierra: Conservación, turismo y recreación, ganadería

Amenazas: Turismo y recreación, sobrepastoreo, incendios, introducción de especies exóticas, construcción de caminos y represas



■ Descripción

Ubicada en el sur-oeste de la Provincia de Santa Cruz, lindante con la República de Chile, se trata de una unidad de conservación administrada por la Administración de Parques Nacionales que protege ambientes del bosque andino, parte de los campos de hielo patagónicos y la cuenca del río Santa Cruz. Se trata de un atractivo de renombre mundial que atrae un gran número de turistas al año, generando un importante recurso económico. Se han detectado 145 especies de aves en la zona. Se extiende la superficie del área para incluir parte de estancias lindantes, que poseen poblaciones de aves amenazadas, principalmente gallineta chica (*Rallus antarcticus*) y cóndor andino (*Vultur gryphus*).

La intención de la APN es la conservación del área, sin embargo se permiten actividades algo perjudiciales como la ganadería y el turismo en gran escala, que han producido modificaciones considerables en varios ambien-

tes. Existen asentamientos poblacionales dentro del AICA, los cascos de las estancias, Puerto Bandera, servicios turísticos varios y el poblado de El Chaltén.

Las principales amenazas son el sobrepastoreo y destrucción de los bosques por la desaparición de renovales y el desarrollo descontrolado del turismo, incluso en áreas intangibles. El desarrollo inmobiliario de zonas circundantes y de El Chaltén son una amenaza potencial. La introducción de especies exóticas (gatos y perros principalmente) también está teniendo un impacto directo sobre algunas aves. La pavimentación del acceso a Puerto Bandera ha cortado el flujo natural del agua que alimenta las lagunas donde está la población de gallineta chica. La posible construcción de una represa sobre el río La Leona aumentaría sensiblemente la cota del lago Viedma, inundando gran parte del hábitat de estepa del parque y los juncales de bahía Túnel, ubicado a escasos kilómetros de un nuevo sitio valioso para la gallineta chica (*Rallus antarcticus*).

¹⁵ Imberti, S. 2005. Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias (Eas. El Sotiego, La Soledad y Anita). En A. S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 424-426. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.